

Gewone vlier

Denominaties

Franse naam : Bureau noir

Engelse naam : Elder

Duitse naam : Holunder

Geslacht

Sambucus

Algemene informatie

Frequentie in deze inventaris : 12

Deze soort is het 98^{de} meest vertegenwoordigd in de inventaris.

De rangschikking van de frequentie van de soorten raadplegen :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

Beschrijving

De eigenschappen van de vlier zijn sinds lang gekend. De mensen uit het neolithicum aten reeds de bessen en de oude Grieken gebruikten vruchten en bloemen voor therapeutische doeleinden. Vandaag worden de bloesems gebruikt in aftreksels met zweetafdrijvende en koortsverdrijvende eigenschappen. De vruchten zijn zeer gegeerd door vogels en rijk aan vitamine C. Ze worden doorgaans tot confituur verwerkt.

De gewone vlier is zo algemeen dat zijn schoonheid haast niet meer wordt opgemerkt. Als heester kan hij breed uitgroeien en tot 8 m hoog worden, maar ook het voorkomen aannemen van een kleine boom met vrij dikke stam.

Kenmerken

Niet bestand tegen verontreiniging.

Afmetingen

Maximale omtrek in deze inventaris : **200 cm**

Maximale omtrek geregistreerd in België : **103 cm (1988)**

Theoretische bereikbare omtrek : 200 cm

Theoretische minimale omtrek voor de opneming in de inventaris* : 70 cm

Theoretische minimale omtrek om een boom als opmerkelijk te kwalificeren* : 105 cm

Maximale hoogte in deze inventaris : 8 m

Theoretische bereikbare hoogte : 10 m

* Deze criteria worden gewogen op de wijze als omschreven in [de methodologie](#).

Excel export van de bomen van deze soort
[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).
