



, 04 Juillet 2019

MORUS NIGRA

Mûrier noir

Dénominations

Nom néerlandais : Zwarte moerbeï

Genre

Morus

Informations générales

Fréquence dans cet inventaire : 6

Cette espèce est la 127^e plus répandue à l'inventaire.

Consulter le classement des fréquences d'espèces :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

Origine

Ouest de l'Asie

Description

Plante de collection introduite en Angleterre en 1548 et cultivée depuis la plus haute antiquité par les Assyriens et les Egyptiens. Le bois du mûrier noir est recherché en ébénisterie et est utilisé en papeterie. L'écorce contient des substances ténifuges.

Cette espèce produit des fruits comestibles.

Ce petit arbre pouvant atteindre 10 m de hauteur offre des fruits rouges foncés délicieux et décoratifs en été, suivi d'une très belle coloration de ses feuilles jaune or en automne.

Taille

Eviter de le tailler

Caractéristiques

Vitesse de croissance : lente

Longévité théorique : 100 - 150 ans

Exigence en luminosité (adulte) : héliophile

Affinités avec type de sol : Sol drainé mais frais

Ne résiste pas à la pollution.

Dimensions

Circonférence maximale dans cet inventaire : **216 cm**

Circonférence maximale recensée en Belgique : **293 cm (1987)**

Circonférence théorique atteignable : 300 cm

Circonférence minimale théorique pour la mise à l'inventaire* : 89 cm

Circonférence minimale théorique pour qualifier un arbre de remarquable* : 134 cm

Hauteur maximale dans cet inventaire : 15 m

Hauteur théorique atteignable : 10 m

* Ces critères sont pondérés de la manière définie dans [la méthodologie](#).

Export excel des arbres de cette espèce

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).
